



Bebé *Advanced*

Vademécum 2026



Innovación aplicada
a la nutrición

MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN.
ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE EL CONSEJO MÉDICO. CONSULTE SIEMPRE A SU PEDIATRA. LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE.
LAS MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES RECIENTES DEBEN RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS Y LA SUPERIORIDAD DE LA LECHE MATERNA.



Bebé


Advanced

Nuestra Misión

Ofrecer una solución especialmente diseñada para cada bebé ayudando a mejorar su calidad de vida y apoyando su desarrollo desde el nacimiento.



Una marca Argentina con gran trayectoria e innovación



Lanzamiento de SanCor Bebé.

La primera fórmula infantil líquida del mercado, iniciando una historia que durará más de 30 años.



SanCor Bebé se une a Roemmers

División Nutricional, con más de 100 años de trayectoria y calidad farmacéutica, sumando innovación y ciencia potenciando su portfolio.

1992

2021

2009

SanCor Bebé comienza a comercializarse en varios países de **latinoamérica**.



SanCor
Bebé
Advanced

**Fórmulas
Especiales**



Continuamos innovando y completamos el portfolio con **SanCor Bebé Advanced Fórmulas Especiales**, ofreciendo una solución específica para cada bebé.

SanCor
Bebé
Advanced **HA**



Completa su portfolio de fórmulas especiales sumando **SanCor Bebé Advanced HA**.

2022 — 2023 — 2024 — 2025 — »

Evolucionamos y lanzamos la primera innovación de esta nueva etapa; **SanCor Bebé Advanced**, única con triple beneficio.

Todo el portafolio se renueva para ofrecer una nueva fórmula y diseño. **SanCor Bebé** es la única con 2 HMOs (2FL y LNnt), GOS, DHA y ARA. Seguimos innovando porque reformularse es avanzar.

SanCor
Bebé
Advanced



SanCor
Bebé
Advanced





Bebé

Advanced

Ofrecemos un portfolio completo,
único en el mercado con:
2 HMOs (2FL - LNnt), GOS, DHA y ARA

**DHA
y ARA**



Impulsa el
desarrollo cognitivo
y visual^{1,2,3,4}

**2 HMOs
(2'FL·LNnt)**



Fortalece
el sistema
inmunitario^{5,6}

GOS



Apoya el
sistema
digestivo⁷

Lactantes con necesidades especiales de alimentación



Lactantes y niños



MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN. ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE EL CONSEJO MÉDICO. CONSULTE SIEMPRE A SU PEDIATRA. LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL LACTANTE. LAS MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES RECIENTES DEBEN RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS Y LA SUPERIORIDAD DE LA LECHE MATERNA. **BIBLIOGRAFÍA:** 1. NEURODEVELOPMENT, NUTRITION, AND GROWTH UNTIL 12 MO OF AGE IN INFANTS FED A LOW-ENERGY, LOW-PROTEIN FORMULA SUPPLEMENTED WITH BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. TIMBY, ERK, DOMELLO F, OLLE HERNEL, BO LO INGERDAL, AND MAGNUS DOMELLOF. THE AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2014; 2. YONG XIA BMEI, BOWEN JANG MSC, LIONG ZHOU BMEI, JIFEI XIA BMEI, LUYI YANG, HUBING LIU. NEURODEVELOPMENTAL OUTCOMES OF HEALTHY TERM INFANTS FED INFANT FORMULA ENRICHED IN BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANE FOR 12 MONTHS - A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. ASIA PAC J CLIN NUTR. 2021;29(3):401-414. 3. SUGAN E, CARLSON PHD AND JOHN COLOMBO, PHD. DODECAHENAIDIC ACID AND ARACHIDONIC ACID NUTRITION IN EARLY DEVELOPMENT. ADV PEDIATR. 2016 AUGUST; 63(1): 453-471. DOI:10.1016/J.YAPD.2016.04.011. 4. BROTH EE, HOFFMAN DR, ULAY R, BROTH DS, PRESTIDGE C. VISUAL ACUITY AND THE ESSENTIALITY OF DODECAHENAIDIC ACID AND ARACHIDONIC ACID IN THE DIET OF TERM INFANTS. PEDIATR RES. 1986 AUG;44(2):201-9. DOI: 10.1203/00006450-198608000-00011. PMID: 970291. 5. ROSA, CASERO, BODE, GURUNG. HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES IMPACT CELLULAR AND INFLAMMATORY GENE EXPRESSION AND IMMUNE RESPONSE FRONT. IMMUNOL. 26 JUNE 2022; DOI: 10.3389/FIMM.2022.81424. 6. PATAZ-SALZ, J, FONTANA L, GIL A. HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES AND IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT. NUTRIENTS. 2018 AUG 6;10(8):1333. DOI: 10.3390/NU10081333. PMID: 30089792. PMID: 360116142. 7. SIERRA C, BEÑAL MJ, BLASCO J, MARTÍNEZ R, DALMAU J, ORTUÑO I, ESPIN B, VASALLO M, GIL O, VIDAL M, INFANTE O, LLES R, MALDONADO J, MORRÓN JM, ROMÁN E. PREBIOTIC EFFECT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE IN HEALTHY INFANTS FED FORMULA CONTAINING GOS AS THE ONLY PREBIOTIC: A MULTICENTRE, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND AND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. EUR J NUTR. 2015 FEB;54(1):89-99. DOI: 10.1007/s00394-014-0689-9. EPUB 2014 MAR 27. PMID: 24671237. PMID: 24633377.



Bebé *Advanced*

Fórmulas Especiales



Únicas con 2 HMOs (2FL y LNnt) y sinbióticos, una combinación única de prebióticos y probióticos que ofrecen 3 beneficios claves:



Beneficio Inmunológico^{1,2,3}

- **Modulan** la respuesta inmune.
- **Refuerzan** la barrera intestinal.
- **Favorecen** el desarrollo de una microbiota saludable.



Beneficio Nutricional^{4,5,6}

- **Aumentan** la biodisponibilidad de minerales.
- **Promueven** la producción de vitaminas.
- **Sus metabolitos “nutren”** a las células intestinales.



Beneficio Metabólico^{7,8,9}

- **Normalizan** el tránsito intestinal.
- **Generan AGCC** (ácidos grasos de cadena corta).
- **Metabolizan** sustancias internas y externas que llegan al colon.



1. JOSÉ M. SAAVEDRA. PROBIÓTICOS, INMUNIDAD Y SALUD EN PEDIATRÍA GACETA MÉDICA DE MÉXICO. 2011;147 SUPPL. 1-9. 2. IMPORTANCE OF BIOTICS IN GUT BARRIER INTEGRITY. INT. J. MOL. SCI. 2022; 23. 2896. <https://doi.org/10.3390/ijms23022896>. 3. CARLOS SIERRA - MARÍA-JOSÉ BERNAL - JAVIER BLASCO - ROSARIO MARTÍNEZ - JAMIE DALMAU - INMACULADA ORTÍO - BEATRIZ ESPÍN - MARÍA-SABEL VASALLO - DAVID GIL - MARÍA-LUISA VICAL - DAMASO INFANTE - ROSAURALESS - JOSÉ MALDONADO - JOSÉ-MANUEL MORENO - ENRIQUETA ROMÁN. PREBIOTIC EFFECT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE IN HEALTHY INFANTS FED FORMULA CONTAINING COS AS THE ONLY PREBIOTIC: A MULTICENTRE, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND AND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. EUR. J. NUTR. 2019; 58(9):98-104. 4. SALLY KIMBA AZO AND DAO-MING ZHENG. THE DEVELOPMENT AND ROLE OF MICROBIOME IN INFANT GUT: AN OVERVIEW OF RECENT LITERATURE. AZAD AND BEN. PEDIATR. THER. 2017; 7(2). 5. LEBLANC JG, MILAN C, DE GIORG S, SESMA F, VAN SINCEREN D, VENTURA M. BACTERIA AS VITAMIN SUPPLIERS TO THEIR HOST: A GUT MICROBIOTA PERSPECTIVE. CURR. OPIN. BIOTECHNOL. 2019; 24(2):160-168. DOI: 10.1016/j.copbio.2012.08.005. 6. USSETI RONDON I, R. MARIA ANEZ ZAVALA C2, ANADINA SALAZAR HADJALLO C3, RUTH TERESA MENENDES BARRIOS H4, MARIA TERESA HEREDIA RODRIGUEZ PROBIOTICOS: GENERALIDADES ARCH. VENEZ. PUER. PEDI VOL. 78 NO. 4 CARACAS DIC. 2015. 7. FLAVIA RODRIGUEZ CASTELLON L2, YVAN VANDERPLAS S3, ENER CAGRI DILENYO D4, ROSARIO FRANCHILLA S4, MASIMO PETTELLO MANTOVANI Y ASSUNTA GRILLO I1, ISADORA BISHETTI G1, LUIS CORRAL LAR I AND ARMINA ACETI H. HEALTH EFFECTS OF INFANT FORMULA SUPPLEMENTED WITH PROBIOTICS OR SINBIOTICS IN INFANTS AND TODDLERS: SYSTEMATIC REVIEW WITH NETWORK META-ANALYSIS. NUTRIENTS 2022; 14. 5175. <https://doi.org/10.3390/nu14025175>. 8. R. TORO CARMIC. PROBIOTICOS, CONCEPTO Y MECANISMOS DE ACCIÓN GASTROENTEROLÓGICA Y NUTRICIÓN INFANTIL. HOSPITAL VALL D'HEBRON. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. BARCELONA. ESPAÑA. AN. PEDIATR. MONOG. 2006; 4(1):30-41. 9. CARLOS CASTAÑEDA GUILLOT. INTESTINAL MICROBIOTA AND CHILD HEALTH REVISTA CUBANA DE PEDIATRÍA. 2018; 9(1):94-110.



Bebé

Advanced

AR

PRESENTACIÓN

Lata de 400 g.

PREPARACIÓN



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Cada 100 kcal	Cada 100 g	Cada 100 ml (al 14,7%)
Valor energético, kcal	100	462	68
Valor energético, kJ	418	1932	284
Carbohidratos, g de los cuales	12	56	8,2
Azúcares totales, g	5,5	26	3,8
Azúcares añadidos, g	2,4	11	1,6
Lactosa, g	5,3	24	3,6
Maltodextrina, g	4,9	23	3,3
Almidón, g	2,0	9,1	1,3
Proteínas\$, g	2,2	10	1,5
Grasas Totales*, g	4,7	22	3,2
Grasas saturadas, g	0,7	3,0	0,4
Grasas monoinsaturadas, g	2,8	13	1,9
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	5,8	0,9
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1132	5228	768
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	106	490	72
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	10	48	7,1
Ácido Araquidónico (ARA), mg	10	48	7,1
Coolesterol, mg	9,8	45	6,7
Fibra Alimentaria, g	0,9	4,1	0,6
Sodio, mg	38	175	26
Vitamina A, µg RE	112	519	76
Vitamina D, µg	1,7	8,0	1,2
Vitamina E, mg α-TE	1,1	5,3	0,78
Vitamina C, mg	18	83	12
Ácido fólico, µg	17	79	12
Vitamina B1, µg	100	441	60
Vitamina B2, µg	190	879	130
Niacina, µg	640	2960	430
Vitamina B6, µg	100	452	70
Vitamina B12, µg	0,30	1,4	0,21
Biotina, µg	1,9	8,8	1,3
Ácido pantoténico, µg	510	2360	350
Vitamina K, µg	6,1	28	4,1
Colina, mg	23	107	16
Calcio, mg	98	452	66
Fósforo, mg	49	228	34
Yodo, µg	30	140	21
Hierro, mg	1,6	7,2	1,1
Magnesio, mg	11	49	7,2
Zinc, mg	1,4	6,5	0,96
Cobre, µg	74	341	50
Manganeso, µg	15	68	10
Potasio, mg	95	438	64
Cloro, mg	70	321	47
Selenio, µg	5,7	26	3,8
Taurina, mg	7,2	33	4,9
Inositol, mg	11	52	7,6
L-carnitina, mg	3,2	15	2,2

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.
\$Proteínas Lácteas.

TABLA DE PREPARACIÓN

Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. **Consultá con el pediatra regularmente.**

Agua potable hervida, ml	90	120	150	180	210	240
Número de medidas	3	4	5	6	7	8
Fórmula total, ml	100	130	170	200	230	270

Cucharilla medidora equivalente a 4,9 g de polvo (agregá la medida al ras y sin comprimir).

0 A 12 MESES



INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada fluida, Maltodextrina, Almidón de maíz modificado, Lactosa, Suero lácteo, Galactooligosacáridos (GOS), Aceite de girasol, Aceite de canola, Aceite de girasol alto oleico, Concentrado de proteínas de suero, Carbonato de calcio, Lecitina de soja (EMU INS 322), Ascorbato de sodio, Fosfato dipotásico, Ácido araquidónico (ARA), Ácido docosahexaenoico (DHA), Citrato de potasio, 2 fucosil lactosa (2FL), Cloruro de colina, Cultivo láctico liofilizado, Inositol, Sulfato magnésico, Taurina, Lacto-n-neotetraosa (LNnT), Fosfato tricálcico, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Palmitato de retinol, Acetato de vitamina E, L-Carnitina, Vitamina D (colecalfiferol), Nicotinamida, D-Pantotenato cálcico, Palmitato de ascorbilo (ANT INS 304), Riboflavina, Sulfato de cobre, Clorhidrato de piridoxina, Vitamina K (filloquinona), Tiamina mononitrato, DL-α-tocoferol (ANT INS 306), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro potásico, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina).

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.



Fórmula nutricionalmente completa indicada para bebés de 0 a 12 meses con reflujo fisiológico. Las fórmulas antireflujo disminuyen el volumen y la frecuencia de las regurgitaciones.^{10,11}

Características

Única con 2 HMOs y Sinbióticos

68 kcal / 100 ml

Espesada con almidón de maíz modificado

DHA y ARA

Exclusiva combinación de ácidos grasos (aceites vegetales y β -Palmitato*)

Beneficios

Promueven el desarrollo de una microbiota saludable^{1,2,3}

Aporte similar a una fórmula de rutina

La fórmula se espesa cuando toma contacto con el pH del estómago

Reduce los episodios de regurgitación^{12,13}

Apoya el desarrollo cognitivo y visual^{14,15}

Excelente digestibilidad¹⁶

1. JOSÉ M. SAAVEDRA, PROBIÓTICOS, INMUNIDAD Y SALUD EN PEDIATRÍA GACETA MÉDICA DE MÉXICO, 2011; 147 SUPPL. 1:9. 2. IMPORTANCE OF BIOTICS IN GUT BARRIER INTEGRITY. INT. J. MOL. SCI. 2022; 23, 2896. <https://doi.org/10.3390/ijms23052896>. 3. CARLOS SIERRA - MARÍA-JOSÉ BERNAL - JAVIER BLASCO - ROSARIO MARTÍNEZ - JAMIE DALMAU - INMACULADA ORTÍO - BEATRIZ ESPÍN - MARÍA-SABEL VASALLO - DAVID GIL - MARÍA-LUISA VIOGA - DAMASO INFANTE - ROSAURA LIES - JOSÉ MALDONADO - JOSÉ-MANUEL MORENO - ENRIQUETA ROMÁN - PREBIOTIC EFFECT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE IN HEALTHY INFANTS FED FORMULA CONTAINING GOS-AS THE ONLY PREBIOTIC: A MULTICENTRE, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND AND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. EUR. J. NUTR. 2015; 54:89-98. 10. YVONNE PLAS - P. ALONSO - P. ALLET - E. DE GREFF - N. DE KONING - H. OFMAN - M. VAN NIECKEL - B. HAUSER - ALGORTHEMS FOR MANAGING INFANT CONSTIPATION, COLIC, REGURGITATION AND COW'S MILK ALLERGY IN FORMULA-FED INFANTS. ACTA PEDIATRICA, 2015 104, PP. 449-457. 11. FLAVIA INDRIO, GIUSEPPE PREZZO, FRANCESCO RAMONDI, LUCIANO CARULLO AND RUGGERO FRANCAVILLA: REGURGITATION IN HEALTHY AND NON-HEALTHY INFANTS. ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 2008, 35:39. 12. CARLOS A. GONZÁLEZ-BERMÚDEZ, CARMEN FRONTELA-SASETA, PATRICIA PESO-ECHEARRI, RUBÉN LÓPEZ-NICOLÁS, CARMEN MARTÍNEZ-GARCÍA - EMPLEO DE FÓRMULAS INFANTILES ANTIREGURGITACIÓN EN LACTANTES. EFECTOS SOBRE LA BIODISPONIBILIDAD MINERAL. REV. CHIL. NUTR. VOL. 38, Nº 4, DICIEMBRE 2011. 13. MAURO BATISTAE DE MORAES, SIGNS AND SYMPTOMS ASSOCIATED WITH GASTROINTESTINAL DEVELOPMENT. J. PEDIATR. PRO. 3, 2016; 923 SUPPL. 1:545-556. 14. VALENCIUELA B. ÁCIDO DIOCOSARÉANICO (DHA) EN EL DESARROLLO FETAL Y EN LA NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL. REV. MED. CHILE (ONLINE), 2001; VOL. 129, Nº 10 (CIUDAD 2012-06-14), PP. 1203-1211. 15. KOLETZKO B, RODRÍGUEZ-PALMERO M. POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN HUMAN MILK AND THEIR ROLE IN EARLY INFANT DEVELOPMENT. J. MAMMARY GLAND BIOL. NUTR. 1999; VOL. 4(3), 269-84. 16. DR. HORACIO F. GONZÁLEZ Y RO. SILVANA VISENTIN NUTRIENTS AND NEURODEVELOPMENT: LIPIDS. UPDATE ARGENT PEDIATR 2016; 114(5):472-476. *DE ORIGEN NATURAL, PROVENIENTE DE LA GRASA LÁCTEA.



Bebé Advanced Comfort

PRESENTACIÓN

Lata de 400 g.

PREPARACIÓN



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Cada 100 kcal	Cada 100 g	Cada 100 ml (al 14,6%)
Valor energético, kcal	100	461	68
Valor energético, kJ	418	1929	286
Carbohidratos, g de los cuales	12	56	8,3
Azúcares totales, g	5,6	26	3,8
Azúcares añadidos, g	2,5	12	1,7
Lactosa, g	5,3	24	3,6
Maltodextrina, g	6,8	31	4,7
Proteínas, g	2,2	10	1,5
Grasas Totales*, g	4,7	22	3,2
Grasas saturadas, g	0,7	3,0	0,5
Grasas monoinsaturadas, g	2,8	13	1,9
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	5,8	0,9
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1134	5228	775
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	106	490	73
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	10	48	7,1
Ácido Araquidónico (ARA), mg	10	48	7,1
Colesterol, mg	9,8	45	6,7
Fibra Alimentaria, g	1,0	4,6	0,7
Sodio, mg	39	179	27
Vitamina A, µg RE	113	519	77
Vitamina D, µg	1,7	8,0	1,2
Vitamina E, mg α-TE	1,1	5,3	0,78
Vitamina C, mg	18	83	12
Ácido fólico, µg	17	79	12
Vitamina B1, µg	100	441	70
Vitamina B2, µg	190	879	130
Niacina, µg	640	2960	440
Vitamina B6, µg	100	452	70
Vitamina B12, µg	0,30	1,4	0,21
Biotina, µg	1,9	8,8	1,3
Ácido pantoténico, µg	510	2360	350
Vitamina K, µg	6,1	28	4,2
Colina, mg	23	107	16
Calcio, mg	100	461	68
Fósforo, mg	50	229	34
Yodo, µg	30	140	21
Hierro, mg	1,5	7,1	1,1
Magnesio, mg	11	49	7,3
Zinc, mg	1,4	6,5	0,96
Cobre, µg	75	346	51
Manganeso, µg	15	68	10
Potasio, mg	96	441	65
Cloro, mg	73	337	50
Selenio, µg	5,7	26	3,9
Taurina, mg	7,2	33	4,9
Inositol, mg	11	52	7,6
L-carnitina, mg	3,2	15	2,2

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.
 †Proteínas Lácteas.

TABLA DE PREPARACIÓN

Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. **Consultá con el pediatra regularmente.**

Agua potable hervida, ml	90	120	150	180	210	240
Número de medidas	3	4	5	6	7	8
Fórmula total, ml	100	130	170	200	230	270

Cucharilla medidora equivalente a 4,9 g de polvo (agregá la medida al ras y sin comprimir).

0 A 12
MESES



INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada fluida, Maltodextrina, Lactosa, Suero lácteo, Galactooligosacáridos (GOS), Aceite de girasol, Aceite de canola, Aceite de girasol alto oleico, Concentrado de proteínas de suero, Goma garrofín (ESP INS 410), Carbonato de calcio, Lecitina de soja (EMU INS 322), Ascorbato de sodio, Fosfato dipotásico, Ácido araquidónico (ARA), Ácido docosahexaenoico (DHA), Citrato de potasio, 2 fucosil lactosa (2FL), Cloruro de colina, Cultivo láctico liofilizado, Inositol, Sulfato magnésico, Taurina, Lacto-n-neotetraosa (LNnT), Fosfato tricálcico, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Palmitato de retinol, Acetato de vitamina E, L-Carnitina, Vitamina D (colecálciferol), Nicotinamida, D-Pantotenato cálcico, Palmitato de ascorbilo (ANT INS 304), Riboflavina, Sulfato de cobre, Clorhidrato de piridoxina, Vitamina K (filoquinona), Tiamina mononitrato, DL-α-tocoferol (ANT INS 306), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro potásico, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina).

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.



Fórmula nutricionalmente completa para bebés de 0 a 12 meses que mejora los malestares digestivos funcionales como los cólicos, constipación y regurgitaciones.

Características

Única con 2 HMOs y Sinbióticos

Bajo contenido de lactosa

Beta
Palmitato*

Espesada con goma de
semillas de algarroba

Exclusiva combinación de ácidos grasos
(aceites vegetales y β -Palmitato*)

DHA y ARA

Beneficios

Promueven el desarrollo de
una microbiota saludable^{1,2,3}

Puede disminuir
el cólico funcional¹⁷

Contribuye a la formación de heces
más parecidas a los bebés
amamantados.^{18,19}
Evita la constipación.

Ayuda a evitar el reflujo y/o la
regurgitación²⁰

Perfil de ácidos grasos similar
a la leche materna

Favorecen el desarrollo
cognitivo y visual^{14,15}

1. JOSÉ M. SÁNCHEZ, PROBIÓTICOS, INMUNIDAD Y SALUD EN PEDIATRÍA GACETA MÉDICA DE MÉXICO. 2011;147 SUPPL. 1-9. 2. IMPORTANCE OF BIOTICS IN GUT BARRIER INTEGRITY. INT. J. MOL. SCI. 2022; 23, 2698. <https://doi.org/10.3390/ijms23022698>. 3. CARLOS SIERRA- MANA-JOSÉ BERNAL- JAVIER BLASCO- ROSARIO MARTÍNEZ- JIMÉNEZ DEL MAR- INMACULADA ORTÍO- BEATRIZ ESPÍN- MARIA GABRIEL VIGALLO- DAVID DEL MAR- LUISA VIDAL- DAMAZO INFANTE- ROSAURALES- JOSÉ MALDONADO- JOSÉ MANUEL MORENO- ENRIQUETA ROMÁN- PREBIOTIC EFFECT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE IN HEALTHY INFANTS FED FORMULA CONTAINING GOS AS THE ONLY PREBIOTIC: A MULTICENTRE, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND AND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. EUR J NUTR (2019) 54:89-98. 14. VALDEQUELA B. ACIDO DODECAHENOICO (DHA) EN EL DESARROLLO FETAL Y EN LA NUTRICIÓN MATERNO-INFANTIL. REV MED. CHILE [ONLINE]. 2001 VOL. 125 N. 10 [CITADO 2012-06-14] PP 1203-1211. 15. KOLETZKO B. RODRÍGUEZ-PALMERO M. POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN HUMAN MILK AND THEIR ROLE IN EARLY INFANT DEVELOPMENT. J NANNARY GLAND BIOL NANNARY GLAND BIOL NEEPLASIA 1999 JUL;4(3):289-94. 17. C. CALVO ROMERO. LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CÓLICO DEL LACTANTE. BOL. PEDIATR 2010; 50: 197-202. 18. LITMANOWITZ ET AL. REDUCED CRIBING IN TERM INFANTS FED HIGH-BETA-PALMITATE FORMULA: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. BMC PEDIATRICS 2014; 14:102. 19. M. INVERO URSPELL, A. SANTAMBROGIA ORLEANI Y M. RODRÍGUEZ-PALMERO SEJIMA. LA IMPORTANCIA DE LOS INGREDIENTES FUNCIONALES EN LAS LECHES Y CEREALES INFANTILES. NUTR. HOSP. 2005; XX (2) 135-146. 20. VANDEPULS Y, RUDOLPH CD, DI LORENZO C, HASSALL E, LIPKAT G, MAZUR L, SONCHEIMER J, STANHO A, THOMSON M, VEEREMAN- WALTERS G, WENZEL TG. PEDIATRIC GAS- TROESOPHAGEAL REFLUX CLINICAL PRACTICE GUIDELINES: JOINT RECOMMENDATIONS OF NASPGHAN AND ESPGHAN. J PEDIATR GASTROENTEROL NUTR 2009 OCT; 49(4):498-547. *DE ORIGEN NATURAL, PROVENIENTE DE LA GRASA LÁCTEA.



Bebé

Advanced

Reducida en Lactosa

PRESENTACIÓN

Lata de 400 g.

PREPARACIÓN



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Cada 100 kcal	Cada 100 g	Cada 100 ml (al 14,6%)
Valor energético, kcal	100	466	68
Valor energético, kJ	418	1950	284
Carbohidratos, g de los cuales	12	56	8,1
Azúcares totales, g	2,9	13	1,9
Azúcares añadidos, g	0,5	2,2	0,3
Lactosa, g	2,4	11	1,6
Maltodextrina, g	9,6	45	6,5
Proteínas, g	2,2	10	1,5
Grasas Totales*, g	4,8	22	3,3
Grasas saturadas, g	0,7	3,1	0,5
Grasas monoinsaturadas, g	2,8	13	1,9
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	6,0	0,9
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1155	5384	783
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	105	491	71
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	10	48	7,0
Ácido Araquidónico (ARA), mg	10	48	7,0
Colesterol, mg	10	49	7,1
Fibra Alimentaria, g	0,9	4,1	0,6
Sodio, mg	39	183	27
Vitamina A, µg RE	111	520	76
Vitamina D, µg	1,7	8,0	1,2
Vitamina E, mg α-TE	1,2	5,4	0,78
Vitamina C, mg	18	83	12
Ácido fólico, µg	17	79	12
Vitamina B1, µg	90	439	60
Vitamina B2, µg	180	829	120
Niacina, µg	630	2930	430
Vitamina B6, µg	100	450	70
Vitamina B12, µg	0,31	1,5	0,21
Biotina, µg	1,9	8,7	1,3
Ácido pantoténico, µg	490	2300	330
Vitamina K, µg	6,1	28	4,1
Colina, mg	22	103	15
Calcio, mg	97	451	66
Fósforo, mg	48	224	33
Yodo, µg	28	130	19
Hierro, mg	1,5	7,2	1,0
Magnesio, mg	7,9	37	5,3
Zinc, mg	1,4	6,5	0,95
Cobre, µg	75	351	51
Manganeso, µg	11	53	7,7
Potasio, mg	92	427	62
Cloro, mg	73	340	49
Selenio, µg	5,6	26	3,8
Taurina, mg	7,1	33	4,8
Inositol, mg	11	51	7,4
L-carnitina, mg	3,2	15	2,2

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.

§Proteínas Lácteas.

TABLA DE PREPARACIÓN

Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. **Consultá con el pediatra regularmente.**

Agua potable hervida, ml	90	120	150	180	210	240
Número de medidas	3	4	5	6	7	8
Fórmula total, ml	100	130	170	200	230	270

Cucharilla medidora equivalente a 4,9 g de polvo (agregá la medida al ras y sin comprimir).

INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada fluida, Maltodextrina, Aceite de girasol, Galactooligosacáridos (GOS), Suero lácteo, Aceite de canola, Aceite de girasol alto oleico, Concentrado de proteínas de suero, Carbonato de calcio, Lecitina de soja (EMU INS 322), Ascorbato de sodio, Citrato de potasio, Fosfato dipotásico, 2 fucosil lactosa (2'FL), Ácido docosahexaenoico (DHA), Ácido araquidónico (ARA), Cloruro de colina, Cultivo láctico liofilizado, Inositol, Sulfato magnésico, Taurina, Lacto-n-neotetraosa (LNnT), Fosfato tricálcico, Sulfato ferroso, Sulfato de zinc, Palmitato de retinol, Acetato de vitamina E, L-Carnitina, Vitamina D (colecalfiferol), Nicotinamida, D-Pantotenato cálcico, Palmitato de ascorbilo (ANT INS 304), Riboflavina, Sulfato de cobre, Clorhidrato de piridoxina, Vitamina K (filoquinona), Tiamina mononitrato, DL-α-tocoferol (ANT INS 306), Ácido fólico, Sulfato de manganeso, Yoduro potásico, Selenito de sodio, D-Biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina).

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.

0 A 12
MESES





Fórmula nutricionalmente completa para bebés desde el nacimiento y hasta los 12 meses con Intolerancia transitoria a la lactosa.

Características

Única con 2 HMOs y Sinbióticos:
Prebióticos y Probióticos

20% de lactosa

DHA y ARA

Beneficios

Promueven el desarrollo de una microbiota saludable.^{1,2,3}

- Mejora los síntomas de la diarrea y del síndrome post gastroenteritis.
- Facilita el retorno a la dieta habitual del bebe y su rápida recuperación.
- Ideal como transición cuando se ha suspendido la lactosa y se indica reintroducirla.
- Mantiene la acción de la lactosa aumentando la biodisponibilidad de calcio.^{21,22}

Favorecen el desarrollo cognitivo y visual.^{14,15}



Bebé Advanced Prematuros

SanCor Bebé Advanced Prematuros es una fórmula para lactantes prematuros o de bajo peso al nacer, desde el nacimiento. Sólo debe usarse por prescripción médica.

PRESENTACIÓN

Lata de 400 g.

PREPARACIÓN



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Cada 100 kcal	Cada 100 g	Cada 100 ml (al 16,8%)
Valor energético, kcal	100	471	79
Valor energético, kJ	418	1973	331
Carbohidratos, g de los cuales	11	50	8,5
Azúcares totales, g	7,0	33	5,6
Azúcares añadidos, g	2,7	12	2,1
Lactosa, g	6,9	32	5,4
Maltodextrina, g	3,8	18	3,0
Proteínas, g	3,0	14	2,4
Grasas Totales*, g	5,0	24	4,0
Grasas saturadas, g	0,8	3,6	0,6
Grasas monoinsaturadas, g	2,9	14	2,3
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	6,2	1,0
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1115	5248	883
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	125	588	99
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	33	154	26
Ácido Araquidónico (ARA), mg	33	154	26
Colesterol, mg	9,1	43	7,2
Fibra Alimentaria, g	0,9	4,1	0,7
Sodio, mg	99	464	78
Vitamina A, µg RE	370	1746	293
Vitamina D, µg	3,7	17	2,9
Vitamina E, mg α-TE	3,9	18	3,1
Vitamina C, mg	19	92	15
Ácido fólico, µg	55	258	43
Vitamina B1, µg	160	754	130
Vitamina B2, µg	230	1070	180
Niacina, µg	3200	14900	2500
Vitamina B6, µg	140	639	110
Vitamina B12, µg	0,34	1,6	0,27
Biotina, µg	3,0	14	2,4
Ácido pantoténico, µg	1200	5870	990
Vitamina K, µg	7,5	35	5,9
Colina, mg	30	142	24
Calcio, mg	129	609	102
Fósforo, mg	72	341	57
Yodo, µg	32	149	25
Hierro, mg	2,0	9,5	1,6
Magnesio, mg	11	52	8,7
Zinc, mg	1,4	6,5	1,1
Cobre, µg	128	601	101
Manganeso, µg	10	49	8,2
Potasio, mg	138	650	109
Cloro, mg	131	616	103
Selenio, µg	6,4	30	5,1
Taurina, mg	6,3	30	5,0
Inositol, mg	16	76	13
L-carnitina, mg	2,5	12	2,0

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.
§Proteínas Lácteas.

TABLA DE PREPARACIÓN

Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. **Consultá con el pediatra regularmente.**

Agua potable hervida, ml	90	120	150	180	210	240
Número de medidas	3	4	5	6	7	8
Fórmula total, ml	100	130	170	200	230	270

Cucharilla medidora equivalente a 5,6 g de polvo (agregá la medida al ras y sin comprimir).

INGREDIENTES

Leche parcialmente descremada fluida, Suero lácteo, Maltodextrina, Lactosa, Galactooligosacáridos (GOS), Aceite de girasol, Aceite de canola, Aceite de girasol alto oleico, Citrato sódico, Lecitina de soja (EMU INS 322), Carbonato de calcio, Ácido araquidónico (ARA), Ácido docosahexaenoico (DHA), Ascorbato de sodio, Fosfato tricálcico, Citrato de potasio, 2 fucosil lactosa (2'FL), Cloruro de colina, Inositol, Cloruro sódico, Acetato de vitamina E, Sulfato magnésico, Taurina, Lacto-n-neotetraosa (LNNt), Palmitato de retinol, Sulfato ferroso, Nicotinamida, Sulfato de zinc, Vitamina D (colecálciferol), D-Pantotenato cálcico, L-Carnitina, Palmitato de ascorbilo (ANT INS 304), Sulfato de cobre, Tiamina mononitrato, Clorhidrato de piridoxina, Riboflavina, Vitamina K (filloquinona), DL-α-tocoferol (ANT INS 306), Ácido fólico, Yoduro potásico, Sulfato de manganeso, Selenito de sodio, D-Biotina.

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.





Fórmula nutricionalmente completa específicamente diseñada para cubrir las necesidades nutricionales del bebé prematuro y/o de bajo peso al nacer.

Características

Aporta 79 kcal / 100 ml y
2.4 g / 100 ml de proteína²³

H. de Carbono

Única con 2 HMOs y Prebióticos

DHA y ARA

Calcio, Fósforo y Vitamina D²⁸

TCM (triglicéridos de cadena media)

Beneficios

Valor calórico y proteico adecuado para
ayudar al crecimiento del bebé prematuro.

Lactosa 73% y maltodextrina 27% para
contribuir a una baja osmolaridad de la
fórmula.²⁴

Promueven el desarrollo de
una microbiota saludable.²⁵

Favorecen el desarrollo
cognitivo y visual.^{26,27}

En niveles que apoya
la mineralización ósea.^{4,5}

Facilitan la absorción de grasas.²⁹

APLV

Alergia a la proteína
de la leche de vaca

La APLV es la alergia alimentaria
más frecuente en los bebés
durante el primer año de vida.

Suele ser una condición transitoria
y generalmente se resuelve entre
el segundo y tercer año de vida.

La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) se puede tratar y también prevenir.



Nutramigen

PRESENTACIÓN

Latas herméticamente cerradas
de 357 g con sistema abre
fácil y medida dosificadora de 9 g.

PREPARACIÓN

Una medida dosificadora de
polvo al ras y comprimida en 60 ml
de agua potable previamente
hervida y entibiada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 kcal	Por 100 g de polvo	Por 100 ml reconstituido
Valor Energético, kcal	100	507	68
Valor Energético, kJ	419	2121	286
Carbohidratos, g	10	52	7,1
Glucosa, g	0,4	2,0	0,3
Maltosa, g	0,5	2,5	0,3
Proteínas, g	2,8	14	1,9
Grasas Totales*, g	5,3	27	3,6
Grasas Saturadas, g	2,3	11	1,5
Grasa Monoinsaturada, g	1,9	9,6	1,3
Grasa Poliinsaturada, g	1,0	5,1	0,7
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	780	3900	530
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	72	360	49
Ácido Araquidónico (ARA), mg	25	125	17
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	17	85	12
Sodio, mg	47	240	33
Vitamina A, g RE	90	450	61
Vitamina D, µg	1,5	7,5	1,0
Vitamina E, mg α-TE	1,3	6,7	0,91
Vitamina C, mg	12	60	8,2
Ácido fólico, µg	16	80	11
Vitamina B1, µg	63	315	43
Vitamina B2, µg	90	450	61
Niacina, µg EN	1000	5000	680
Vitamina B6, µg	60	300	41
Vitamina B12, µg	0,30	1,5	0,20
Biotina, µg	3,0	15	2,0
Ácido Pantoténico, µg	500	2500	340
Vitamina K, µg	9,0	45	6,1
Colina, mg	24	120	16
Calcio, mg	94	470	64
Fósforo, mg	52	260	35
Yodo, µg	15	75	10
Hierro, mg	1,8	9,0	1,2
Magnesio, mg	8,0	40	5,4
Zinc, mg	1,0	5,0	0,68
Cobre, µg	75	380	52
Manganeso, µg	25	125	17
Potasio, mg	110	550	75
Cloro, mg	86	430	58
Selenio, µg	2,8	14	1,9
Taurina, mg	6,0	30	4,1
Inositol, mg	24	120	16
L-carnitina, mg	2,0	10	1,4

*Fuente de proteínas de origen animal.

*No aporta cantidades significativas de grasas trans, fibra alimentaria y colesterol.

INGREDIENTES

Sólidos de jarabe de maíz, proteína láctea extensamente hidrolizada, aceite de palma, aceite de coco, aceite de soja, aceite de girasol alto oleico, almidón de maíz, citrato de calcio, fosfato de calcio, cloruro de potasio, citrato de potasio, ácido araquidónico (Mortierella alpina), citrato de sodio, ácido docosahexaenoico (Schizochytrium sp.), cloruro de colina, L-cistina, hidróxido de calcio, inositol, Vitamina C (ascorbato de sodio), óxido de magnesio, L-tirosina, L-triptófano, sulfato ferroso, taurina, Lactobacillus rhamnosus GG (0,034 %), vitamina E (alfa tocoferol), sulfato de zinc, L-carnitina, vitamina A, niacinamida, vitamina K (filloquinona), pantotenato de calcio, vitamina D3 (colecalciferol), biotina, vitamina B12 (cianocobalamina), sulfato cúprico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, sulfato de manganeso, yoduro de sodio, ácido fólico, selenito de sodio, ANT palmitato de ascorbilo (INS 304), ACREG hidróxido de potasio (INS 525).

CONTIENE DERIVADO DE LECHE.



~8 de cada
10 bebés
superan la APLV**
a los 12 meses
de tratamiento

Alergia

Fórmula con proteínas extensamente
hidrolizadas con probiótico LGG⁺.

Indicación de uso

Fórmula para lactantes de 0 a 12 meses
para el tratamiento de la APLV.^{>>}

Beneficios

- Clínicamente comprobado,
~8 de cada 10 bebés adquieren
tolerancia a la PLV^{>>>} a los 12 meses
de tratamiento^{>>>>}.³⁰
- Contiene nutrientes que
apoyan al Desarrollo Mental.³¹

Características

- Única fórmula hipoalergénica con LGG⁺.
- Proteínas extensamente hidrolizadas
(95% pesan menos de 1000 Daltons).
50% aminoácidos libres, 50% pequeños péptidos.
- Única con LGG⁺ de las fórmulas hipoalergénicas.^{*}
 - 100% libre de lactosa y sacarosa.
- Niveles de DHA^{*} similares a los encontrados en la leche materna,
de acuerdo a recomendaciones de expertos mundiales.³²
 - Colina, 24 mg/100 kcal, nutriente que
apoya el desarrollo cerebral del lactante.³³

³⁰. BERNI CANANI A, NOCERINO R, TERRIN G, ET AL. FORMULA SELECTION FOR MANAGEMENT OF CHILDREN WITH COW MILK ALLERGY INFLUENCES THE RATE OF ACQUISITION OF TOLERANCE: A PROSPECTIVE MULTICENTER STUDY. J PEDIATR. 2013 APR 10; 31. CUSICK SE, GEORGEFF AK. THE ROLE OF NUTRITION IN BRAIN DEVELOPMENT: THE GOLDEN OPPORTUNITY OF THE "FIRST 1000 DAYS". J PEDIATR. 2016 AUG; 175:16-21. DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.05.013. EMBL 2016 JUN 3. PMID: 27266965; PMCID: PMC4881537. ³². BERTHOOLD KOLEZNYI LIPIDS EN LA LECHE MATERNA ANN NUTR METAB 2016;69(SUPPL 2):28-40. ³³. MIN JG, LECHE TELL, MONTE CL, MITCHESSER SH. OXIDINE AND DHA IN MATERNAL AND INFANT NUTRITION: SYNERGISTIC IMPLICATIONS IN BRAIN AND EYE HEALTH. NUTRITS. 2016 MAR 21; 11(5):1125. DOI: 10.3390/NU11051125. PMID: 27117140; PMCID: PMC4826660. ^{*} LGG: LACTICASEBACILLUS RHAMNOSUS SG. >>> APLV: ALERGA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA. >>> PLV: PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA. >>>> EN COMPARACIÓN CON FÓRMULA DE CASERA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, FÓRMULA DE APROX HIDROLIZADA, FÓRMULA DE SOYA, FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS. ¹DHA: ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO. ²ARA: ÁCIDO ARÁQUIDÓICO. ³SEGÚN EL MERCADO ARGENTINO DE FÓRMULAS HIPOALERGÉNICAS A MAYO 2022.



Bebé Advanced HA

PRESENTACIÓN

Lata de 400 g.

PREPARACIÓN



TABLA DE PREPARACIÓN

Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé.

Edad del bebé	Cantidad por toma		Número de tomas diarias
	Agua potable hervida (ml)	Número de medidas	
1º y 2º semanas	60	2	7
2º y 4º semanas	90	3	6
1 a 2 meses	120	4	5
2 a 4 meses	150	5	5
4 a 6 meses	180	6	4-5
6 a 10 meses	200	7	3-4
Más de 10 meses	200	7	2-3

Cucharilla medidora equivalente a 4,3 g de polvo (agregá la medida al ras y sin comprimir).

INGREDIENTES

Lactosa, Aceites vegetales (Aceite de girasol, Aceite de colza, Aceite de coco), Proteína de suero de leche hidrolizada, Galactooligosacáridos (GOS de lactosa), Grasa láctea anhidra, Minerales (Hidróxido de potasio, Cloruro de calcio, Fosfato de sodio, Citrato de calcio, Fosfato magnésico, Cloruro de potasio, Sulfato de zinc, Yoduro de potasio, Sulfato de hierro, Sulfato de cobre, Sulfato de manganeso, Selenito de sodio), Aceite de pescado refinado, Bitartrato de colina, Aceite de Mortierella alpina, Vitaminas (L-ascorbato sódico, DL-alfa-tocoferil acetato, Nicotinamida, D-pantotenato cálcico, Colecalciferol, Acetato de retinilo, D-biotina, Cianocobalamina, Filoquinona, Ácido fólico, Tiamina hidrocloreto, Piridoxina hidrocloreto, Riboflavina), 2'-fucosilactosa, L-fenilalanina, L-tirosina, L-triptófano, Inositol, L-histidina, Taurina, Nucleótidos (Monofosfato de citidina 5', Uridinto disódico 5', Adenosina 5'-monofosfato, 5-monofosfato de inosina disódico, 5-monofosfato de guanosa disódico), L-carnitina-L-tartrato, Emulsionante EMU INS 72c (Esteres de ácido cítrico de mono- y diglicéridos de ácidos grasos), Antioxidantes (Palmitato de ascorbilo (ANT INS 304), Extracto rico en tocoferoles (ANT INS 307))

CONTIENE DERIVADOS DE LECHE, PESCADO Y SOJA.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Cada 100 g	Cada 100 g	Cada 100 ml reconstituido
Valor energético, kcal	-	504	65
Valor energético, kJ	-	2109	270
Carbohidratos, g de los cuales:	11	56	7.2
Azúcares totales, g	11	56	7.2
Azúcares añadidos, g	0,6	2,8	0,4
Lactosa, g	11	54	6,8
Proteínas, g	1,9	9,8	1,3
Grasas totales*, g	5,2	26	3,3
Grasas saturadas, g	2,1	11	1,4
Grasas monoinsaturadas, g	1,8	9,0	1,2
Grasas poliinsaturadas, g	0,9	4,6	0,6
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	655	3300	422
Omega 3 - Ácido α -linoleico, mg	79	400	51
Ácido Araquidónico (ARA), mg	24	120	15
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	24	120	15
Grasas Trans, g	0	0	0
Fibra Alimentaria, g	0,6	2,9	0,4
GOS, g	0,8	4,0	0,5
2'-Fucosil lactosa (2'-FL), mg	36	180	23
Sodio, mg	29,8	150	19,2
Potasio, mg	139	700	89,6
Calcio, mg	69,4	350	44,8
Magnesio, mg	9,92	50	6,4
Fósforo, mg	43,6	220	28,2
Cloro, mg	65,5	330	42,2
Hierro, mg	1,1	5,5	0,70
Zinc, mg	0,79	4,0	0,51
Cobre, μ g	81	410	52
Yodo, μ g	21,8	110	14,1
Manganeso, μ g	10,3	52	6,7
Selenio, μ g	4,0	20	2,6
Flúor, μ g	20	100	13
Vitamina A, μ g RE	89,3	450	57,6
Vitamina D, μ g	2,2	11	1,4
Vitamina E, mg α -TE	2,6	13	1,7
Vitamina K, μ g	10	50	6,4
Vitamina B1, μ g	89	450	58
Vitamina B2, μ g	159	800	102
Vitamina B6, μ g	89	450	58
Vitamina B12, μ g	0,30	1,5	0,20
Niacina, mg	0,9	4,5	0,6
Ácido pantoténico, mg	0,8	4,0	0,5
Ácido fólico, μ g	26	130	17
Vitamina C, mg	20	100	13
Biotina, μ g	4,0	20	2,6
Taurina, mg	6,0	30	3,8
Colina, mg	36	180	23
Inositol, mg	12	60	7,7
L-carnitina, mg	2,0	10	1,3
AMP, mg	1,0	5,0	0,6
CMP, mg	1,2	6,0	0,8
GMP, mg	0,4	2,0	0,3
IMP, mg	0,6	3,0	0,4
UMP, mg	0,8	4,0	0,5

*No aporta cantidades significativas de grasas trans. §Proteínas Lácteas.





Única con HMO (2'FL)*

Ayudan a modular la respuesta inmune¹

Favorecen una microbiota intestinal saludable²

Apoyan el sistema inmune

100% proteína hidrolizada
(1,3grs / 100ml y 1,9gra / 100ml)

100% lactosa

Alto contenido de DHA y ARA

Nucleótidos



**NO CONTIENE
ACEITE DE PALMA**

1. SEKEREL BE, BINGOL G, CILILU COKURBAS F, COKURBAS KANSLI A, OZEN H, TAMAY Z. AN EXPERT PANEL STATEMENT ON THE BENEFICIAL EFFECTS OF HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES (HMOs) IN EARLY LIFE AND POTENTIAL UTILITY OF HMO-SUPPLEMENTED INFANT FORMULA IN COW'S MILK PROTEIN ALLERGY. J ASTHMA ALLERGY. 2021 SEP 24;14(1):147-1164. DOI: 10.2147/JAA.S323724. PMID: 34594114; PMCID: PMC8478436. 2. PLAZA-DAZ J, FONTANA L, GIL A. HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES AND IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT. NUTRIENTS. 2019 AUG 8;10(8):1038. DOI: 10.3390/NU10081038. PMID: 3096792. PMCID: PMC63116142. 3. SZAJEWSKA H, & HORWATH A. A PARTIALLY HYDROLYZED 100% WHEY FORMULA AND THE RISK OF ECZEMA AND ANY ALLERGY: AN UPDATED META-ANALYSIS. WORLD ALLERGY ORGANIZATION JOURNAL. (2017). VANDEPLAS, Y. PREVENTION AND MANAGEMENT OF COW'S MILK ALLERGY IN NON-EXCLUSIVELY BREASTFED INFANTS. NUTRIENTS. 9(7), 731. (2017). VANDEPLAS, Y., & SHAMIR, R. HYDROLYZED FORMULAS FOR ALLERGY PREVENTION. JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION. 58(5), 549-552. (2014). HYDROLYZED FORMULAS FOR ALLERGY PREVENTION. VANDEPLAS, Y., BHATTA J, SHAMIR R, AGOSTONI C, TURKO D, STANOVIC A, SZAJEWSKA H. J PEDIATR GASTROENTEROL NUTR. 2014 MAY;58(5):549-52. *SEGUN LO COMERCIALIZADO EN LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA CATEGORIA DE FÓRMULAS INFANTILES HASTA AGOSTO 2025.



Bebé Advanced 1

PRESENTACIÓN

Polvo: Lata y estuche de 800 g

Líquido: Brick de 200 y 500 ml

PREPARACIÓN

Una medida dosificadora (4,8 g) de polvo al ras sin comprimir en 30 ml de agua potable previamente hervida y entibada.

Proporciona 67 kcal cada 100 ml reconstituídos.



ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN

La siguiente tabla tiene recomendaciones generales. Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. Consultá con el pediatra regularmente.

Edad del bebé	Cantidad por toma		Número de tomas diarias
	Agua potable hervida (ml)	Número de medidas	
1ª y 2ª semana	90	3	6
3ª y 4ª semana	120	4	5
2º mes	150	5	5
3ª y 4ª mes	180	6	5
5ª y 6ª mes	210	7	5

Reconstituir con agua potable. Usá el siguiente cuadro para las cantidades correctas de agua potable hervida y polvo que debes usar, a menos que tu médico te recomiende algo diferente. Usá la cucharilla medidora que viene en el envase para agregar el polvo. Guardá la cucharilla medidora **LIMPIA y SECA** en el envase. Cada cucharilla tiene una capacidad de 4,8 g de producto.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 kcal	Por 100 g	Por 100 ml Reconstituídos
Valor energético, kcal	100	463	67
Valor energético, kJ	418	1938	279
Carbohidratos, g de los cuales	12	56	8,1
Azúcares totales, g	7,4	34	4,9
Azúcares añadidos, g	4,3	20	2,9
Lactosa, g	7,2	33	4,8
Maltodextrina, g	5,0	23	3,3
Proteínas, g	2,2	10	1,5
Grasas Totales*, g	4,7	22	3,2
Grasas saturadas, g	0,7	3,0	0,4
Grasas monoinsaturadas, g	2,8	13	1,9
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	5,8	0,8
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1129	5228	753
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	106	490	71
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	10	48	6,9
Ácido Araquidónico (ARA), mg	10	48	6,9
Colesterol, mg	9,8	45	6,5
Fibra Alimentaria, g	0,9	4,1	0,6
Sodio, mg	37	171	25
Vitamina A, µg RE	112	519	75
Vitamina D, µg	1,7	8,0	1,2
Vitamina E, mg α-TE	1,1	5,3	0,76
Vitamina C, mg	18	83	12
Ácido fólico, µg	17	79	11
Vitamina B1, µg	100	441	60
Vitamina B2, µg	190	879	130
Niacina, µg	640	2960	430
Vitamina B6, µg	100	452	70
Vitamina B12, µg	0,30	1,4	0,20
Biotina, µg	1,9	8,8	1,3
Ácido pantoténico, µg	510	2360	340
Vitamina K, µg	6,1	28	4,0
Colina, mg	23	107	15
Calcio, mg	100	462	67
Fósforo, mg	50	230	33
Yodo, µg	30	140	20
Hierro, mg	1,5	7,1	1,0
Magnesio, mg	11	49	7,1
Zinc, mg	1,4	6,5	0,94
Cobre, µg	74	344	50
Manganeso, µg	15	68	9,8
Potasio, mg	95	441	64
Cloro, mg	70	322	46
Selenio, µg	5,7	26	3,8
Taurina, mg	7,2	33	4,8
Inositol, mg	11	52	7,4
L-carnitina, mg	3,2	15	2,1

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.

§Proteínas Lácteas.

2 HMOs
(2'FL-LNnT)



GOS

Favorece la digestibilidad⁷

Beneficios

- Apoya el desarrollo de una microbiota saludable.
- Impulsa el desarrollo mental.³⁴
 - Ayuda a reforzar el sistema inmune.^{35,36}

Características

Lípidos: Grasa láctea y aceites vegetales (girasol y canola).
Con DHA y ARA.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



Bebé Advanced 2

PRESENTACIÓN

Polvo: Lata y estuche de 800 g

Líquido: Brick de 200 y 500 ml

PREPARACIÓN

Una medida dosificadora (4,8 g) de polvo al ras sin comprimir en 30 ml de agua potable previamente hervida y entibada.

Proporciona 66 kcal cada
100 ml reconstituídos.

6 A 12
MESES



ESQUEMA DE ALIMENTACIÓN

La siguiente tabla tiene recomendaciones generales. Seguí las indicaciones de tu pediatra para alimentar a tu bebé. Consultá con el pediatra regularmente.

Edad del bebé	Cantidad por toma		Número de tomas diarias
	Agua potable hervida (ml)	Número de medidas	
6° mes	210	7	5
A partir del 7° mes	240	8	5

Reconstituir con agua potable. Usá el siguiente cuadro para las cantidades correctas de agua potable hervida y polvo que debes usar, a menos que tu médico te recomiende algo diferente. Usá la cucharilla medidora que viene en el envase para agregar el polvo. Guardá la cucharilla medidora **LIMPIA y SECA** en el envase. Cada cucharilla tiene una capacidad de 4,8 g de producto.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 kcal	Por 100 g	Por 100 ml Reconstituídos
Valor energético, kcal	100	462	66
Valor energético, kJ	418	1933	276
Carbohidratos, g de los cuales	12	54	7,7
Azúcares totales, g	6,9	32	4,6
Azúcares añadidos, g	3,2	15	2,1
Lactosa, g	6,7	31	4,4
Maltodextrina, g	5,0	23	3,3
Proteínas, g	2,6	12	1,7
Grasas Totales*, g	4,8	22	3,1
Grasas saturadas, g	0,7	3,1	0,4
Grasas monoinsaturadas, g	2,8	13	1,8
Grasas poliinsaturadas, g	1,3	5,8	0,8
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	1132	5240	745
Omega 3 - Ácido α -linolénico, mg	106	490	70
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	10	48	6,8
Ácido Araquidónico (ARA), mg	10	48	6,8
Colesterol, mg	9,8	45	6,5
Fibra Alimentaria, g	0,9	4,1	0,6
Sodio, mg	43	198	28
Vitamina A, μ g RE	112	520	74
Vitamina D, μ g	1,7	8,0	1,1
Vitamina E, mg α -TE	1,1	5,3	0,75
Vitamina C, mg	18	83	12
Ácido fólico, μ g	17	80	11
Vitamina B1, μ g	100	453	60
Vitamina B2, μ g	210	952	140
Niacina, μ g	650	3000	430
Vitamina B6, μ g	100	460	70
Vitamina B12, μ g	0,32	1,5	0,21
Biotina, μ g	2,1	9,5	1,4
Ácido pantoténico, μ g	540	2510	360
Vitamina K, μ g	6,1	28	4,0
Colina, mg	24	111	16
Calcio, mg	119	549	78
Fósforo, mg	62	285	41
Yodo, μ g	32	146	21
Hierro, mg	1,5	7,1	1,0
Magnesio, mg	12	55	7,9
Zinc, mg	1,5	6,7	0,96
Cobre, μ g	75	345	49
Manganeso, μ g	15	68	9,7
Potasio, mg	115	534	76
Cloro, mg	74	344	49
Selenio, μ g	5,8	27	3,8
Taurina, mg	7,2	33	4,7
Inositol, mg	12	56	7,9
L-carnitina, mg	3,2	15	2,1

* No aporta cantidades significativas de grasas trans.

§ Proteínas Lácteas.



ÚNICAS FÓRMULAS CON: 2 HMOs (2'FL y LNnT), GOS, DHA y ARA

DHA
y ARA



Impulsa el desarrollo
cognitivo y visual^{1,2,3,4}

2 HMOs
(2'FL-LNnT)



Fortalece el
sistema Inmune^{5,6}

GOS



Favorece la
digestibilidad⁷

Indicación de uso

SanCor Bebé Advanced 2 está indicada para la alimentación de lactantes de 6 a 12 meses de edad en caso de que la lactancia materna no sea posible o para su complementación.

Beneficios

- Apoya el desarrollo de una microbiota saludable.
- Impulsa el desarrollo mental.^{3,4}
- Ayuda a reforzar el sistema inmune.^{3,5,6}

Características

Carbohidratos: Lactosa y maltodextrina.

Mezcla de prebióticos: 2 HMOs y Galacto-oligosacáridos (GOS).

Proteínas: Relación suero/caseína igual a 50/50.

Lípidos: Grasa láctea y aceites vegetales (girasol y canola).
Con DHA y ARA.

1. NEURODEVELOPMENT, NUTRITION, AND GROWTH UNTIL 12 MO OF AGE IN INFANTS FED A LOW-ENERGY, LOW-PROTEIN FORMULA SUPPLEMENTED WITH BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. INKLAS TMBY, ERIC DOMELLOF, OLLE HERNELL, BO LO INERDAL, AND MAGNUS DOMELLOF. THE AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2014; 2: YONG XA BMEI, BOWEN JIANG MSC, LIKONG ZHOU BMEI, JUEFI MA BMEI, LUW YANG, HUBING LU NEURODEVELOPMENTAL OUTCOMES OF HEALTHY CHINESE TERM INFANTS FED INFANT FORMULA ENRICHED IN BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANE FOR 12 MONTHS - A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. ASIA PAC J CLIN NUTR 2021; 30(3): 401-414. 8. SSSANI C, CARLSON, PHO AND JOHN COLOMBO. PHO DOCOSAHENAIENIC ACID AND ARACHIDONIC ACID NUTRITION IN EARLY DEVELOPMENT ADV PEDIATR. 2016 AUGUST; 63(1): 433-471. DOI:10.1016/j.yapd.2016.04.011. 4. BROCH EE, HOFFMAN DR, UNAY Y, BROCH DG, PRESTIDGE C. VISUAL ACUTY AND THE ESSENTIALITY OF DOCOSAHENAIENIC ACID AND ARACHIDONIC ACID IN THE DIET OF TERM INFANTS. PEDIATRES. 1988 AUG;44(2):201-8. DOI: 10.1203/00006450-198808000-00011. PMID: 970291. 5. ROSA CASERO, BOOE, GURUNG HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES IMPACT CELLULAR AND INFLAMMATORY GENE EXPRESSION AND IMMUNE RESPONSE FRONT. IMMUNOL. 26 JUNE 2022 SEC. NUTRITIONAL IMMUNOLOGY VOLUME 13 - 2022. 6. PLAZA-DAZ J, FONTANA L, GLA, HUMAN MILK OLIGOSACCHARIDES AND IMMUNE SYSTEM DEVELOPMENT. NUTRIENTS. 2018 AUG 8; 10(8):1038. DOI: 10.3390/n10081038. PMID: 30069762. PMID: 31611472. 7. SIERRA C, GERNAL ML, GLASSO J, MARTINEZ R, CALMAU J, ORTIZO J, ESPINOL, VARGASLOM GL D, IDEAL ML, INFANTE D, LEST R, MALDONADO J, MORENO JM, ROMÁN E. PREBIOTIC EFFECT DURING THE FIRST YEAR OF LIFE IN HEALTHY INFANTS FED FORMULA CONTAINING GOS AS THE ONLY PREBIOTIC, A MULTICENTRE, RANDOMISED, DOUBLE-BLIND AND PLACEBO-CONTROLLED TRIAL. EUR J NUTR. 2015 FEB;54(1):89-99. DOI: 10.1007/s00384-014-0689-9. EPUB 2014 MAR 27. PMID: 24671227. PMID: 24633217. 34. INKLAS TMBY, ERIC DOMELLOF, OLLE HERNELL, BO LO INERDAL, AND MAGNUS DOMELLOF NEURODEVELOPMENT, NUTRITION, AND GROWTH UNTIL 12 MO OF AGE IN INFANTS FED A LOW-ENERGY, LOW-PROTEIN FORMULA SUPPLEMENTED WITH BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANES: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. AM J CLIN NUTR 2014;90:89-94. 35. HANNALETT, KELLY CHARLETT, SHAN-YI CHEN, BO LO INERDAL D AND CAROLYN GILSPY EFFECT OF BOVINE MILK FAT GLOBULE MEMBRANES AS A COMPLEMENTARY FOOD ON THE SERUM METABOLIC AND IMMUNE MARKERS OF 6-11 MONTH-OLD PERUVIAN INFANTS NPJ SCIENCE OF FOOD 2018;2:6. D. 36. DEOLANDA M F, SCALAPPIN, SUSAN H, MITTMESSER, Y GUALTY W, WELING, CHERYL L, HARRIS, JOHN D, MARLINCYC, Z. CAREY WALKER, S NICOLA BOS, JISATO TOIUKO, JUSEPPO SALMINEN, AND JON A. VANDERHOOF NEW PREBIOTIC BLEND OF POLYDXTROSE AND GALACTO-OLIGOSACCHARIDES HAS A BIOGENIC EFFECT IN YOUNG INFANTS. JPN. VOLUME 54, NUMBER 3, MARCH 2012.



Bebé Advanced 3

PRESENTACIÓN

Polvo: Lata y estuche de 800 g
Líquido: Brick de 200 ml y 1 litro

PREPARACIÓN

Una medida dosificadora (4,9 g)
de polvo al ras sin comprimir en 30 ml
de agua potable previamente
hervida y entibada.

Proporciona 63 kcal cada
100 ml reconstituídos.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 kcal	Por 100 g	Por 100 ml (al 14,7%)
Valor energético, kcal	100	429	63
Valor energético, kJ	418	1793	264
Carbohidratos, g	14	59	8,6
Azúcares totales, g	9,3	40	5,9
Azúcares añadidos, g	2,6	11	1,6
Lactosa, g	9,1	39	5,7
Maltodextrina, g	4,6	20	2,9
Proteínas, g	3,2	14	2,0
Grasas Totales*, g	3,6	15	2,3
Grasas saturadas, g	0,3	1,5	0,2
Grasas monoinsaturadas, g	2,4	10	1,5
Grasas poliinsaturadas, g	0,8	3,3	0,5
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	621	2655	391
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	109	465	69
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	11	48	7,1
Ácido Araquidónico (ARA), mg	22	94	14
Colesterol, mg	4,4	19	2,8
Fibra Alimentaria, g	0,9	3,7	0,5
Sodio, mg	60	259	38
Vitamina A, µg RE	111	477	70
Vitamina D, µg	1,7	7,3	1,1
Vitamina E, mg α-TE	2,5	11	1,6
Vitamina C, mg	19	79	12
Ácido fólico, µg	29	126	19
Vitamina B1, µg	150	659	100
Vitamina B2, µg	280	1200	180
Niacina, µg	970	4160	610
Vitamina B6, µg	120	520	80
Vitamina B12, µg	0,90	3,8	0,56
Biotina, µg	3,6	15	2,3
Ácido pantoténico, µg	1300	5370	790
Vitamina K, µg	14	59	8,7
Colina, mg	12	52	7,7
Calcio, mg	165	708	104
Fósforo, mg	113	484	71
Yodo, µg	38	162	24
Hierro, mg	1,6	7,0	1,0
Magnesio, mg	12	51	7,4
Zinc, mg	1,2	5,1	0,75
Cobre, µg	54	230	34
Manganeso, µg	27	114	17
Potasio, mg	147	631	93
Cloro, mg	104	445	65
Selenio, µg	4,8	21	3,0

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.

§Proteínas Lácteas.



ÚNICAS FÓRMULAS CON: 2 HMOs (2'FL y LNnT), GOS, DHA y ARA

**DHA
y ARA**



Impulsa el desarrollo
cognitivo y visual^{1,2,3,4}

**2 HMOs
(2'FL-LNnT)**



Fortalece el
sistema Inmune^{5,6}

GOS



Favorece la
digestibilidad⁷

Indicación de uso

SanCar Bebé Advanced 3 está indicada
para niños de 1 año en adelante.

Beneficios

- Apoya el desarrollo de una microbiota saludable.
- Impulsa el desarrollo mental.³⁴
- Ayuda a reforzar el sistema inmune.^{35,36}

Características

Carbohidratos: Lactosa y maltodextrina.

Mezcla de prebióticos: 2 HMOs y Galacto-oligosacáridos (GOS).

Proteínas: Relación suero/caseína igual a 40/60.

Lípidos: Grasa láctea y aceites vegetales (girasol y canola).
Con DHA y ARA.



Bebé Advanced 3+

PRESENTACIÓN

Polvo: Lata de 800 g
Líquido: Brick de 200 ml

PREPARACIÓN

Una medida dosificadora (4,9 g)
de polvo al ras sin comprimir en 30 ml
de agua potable previamente
hervida y entibada.

Proporciona 63 kcal cada
100 ml reconstituídos.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100 kcal	Por 100 g	Por 100 ml (al 14,7%)
Valor energético, kcal	100	429	63
Valor energético, kJ	418	1793	264
Carbohidratos, g de los cuales:	14	59	8,6
Azúcares totales, g	9,3	40	5,9
Azúcares añadidos, g	2,6	11	1,6
Lactosa, g	9,1	39	5,7
Maltodextrina, g	4,6	20	2,9
Proteínas, g	3,2	14	2,0
Grasas Totales*, g	3,6	15	2,3
Grasas saturadas, g	0,3	1,5	0,2
Grasas monoinsaturadas, g	2,4	10	1,5
Grasas poliinsaturadas, g	0,8	3,3	0,5
Omega 6 - Ácido linoleico, mg	621	2655	391
Omega 3 - Ácido α-linolénico, mg	109	465	69
Ácido Docosahexaenoico (DHA), mg	11	48	7,1
Ácido Araquidónico (ARA), mg	22	94	14
Colesterol, mg	4,4	19	2,8
Fibra Alimentaria, g	0,9	3,7	0,5
Sodio, mg	60	259	38
Vitamina A, µg RE	111	477	70
Vitamina D, µg	1,7	7,3	1,1
Vitamina E, mg α-TE	2,5	11	1,6
Vitamina C, mg	19	79	12
Ácido fólico, µg	29	126	19
Vitamina B1, µg	150	659	100
Vitamina B2, µg	280	1200	180
Niacina, µg	970	4160	610
Vitamina B6, µg	120	520	80
Vitamina B12, µg	0,90	3,8	0,56
Biotina, µg	3,6	15	2,3
Ácido pantoténico, µg	1300	5370	790
Vitamina K, µg	14	59	8,7
Colina, mg	12	52	7,7
Calcio, mg	165	708	104
Fósforo, mg	113	484	71
Yodo, µg	38	162	24
Hierro, mg	1,6	7,0	1,0
Magnesio, mg	12	51	7,4
Zinc, mg	1,2	5,1	0,75
Cobre, µg	54	230	34
Manganeso, µg	27	114	17
Potasio, mg	147	631	93
Cloro, mg	104	445	65
Selenio, µg	4,8	21	3,0

*No aporta cantidades significativas de grasas trans.

§Proteínas Lácteas.



ÚNICAS FÓRMULAS CON: 2 HMOs (2'FL y LNnT), GOS, DHA y ARA



Impulsa el desarrollo
cognitivo y visual^{1,2,3,4}



Fortalece el
sistema Inmune^{5,6}



Favorece la
digestibilidad⁷

Indicación de uso

SanCor Bebé Advanced 3+ está indicada
para niños de 2 años en adelante.

Beneficios

- Apoya el desarrollo de una microbiota saludable.
- Impulsa el desarrollo mental.³⁴
- Ayuda a reforzar el sistema inmune.^{35,36}

Características

Carbohidratos: Lactosa y maltodextrina.

Mezcla de prebióticos: 2 HMOs y Galacto-oligosacáridos (GOS).

Proteínas: Relación suero/caseína igual a 40/60.

Lípidos: Grasa láctea y aceites vegetales (girasol y canola).
Con DHA y ARA.

BioGaia[®]

L. reuteri DSM 17938

*El probiótico más
estudiado para el
cuidado de bebés y niños*

PRESENTACIONES

Gotas y comprimidos
masticables sabor limón

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción cada 5 gotas= 0,19 ml
Porciones por envase: 26 aprox.

NUTRIENTE	Cantidad por porción	%VD*
Valor energético	0 Kcal - 0 kJ	0%
Carbohidratos	0 g	0%
Proteínas	0 g	0%
Grasas Totales	0 g	0%
Grasas Saturadas	0 g	0%
Grasas Trans	-	0%
Fibra alimentaria	0 g	0%
Sodio	0 mg	0%
		%IDR**
Vitamina D3 (Colecalciferol)	10 µg	200% (19-50 años) 100% (51-65 años) 66% (>65 años)
L. reuteri DSM 17938	1 x 10 ⁸ UFC	

*%Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

**Ingesta Diaria Recomendada (IDR).

La tabla nutricional corresponde a Biogaia en gotas con Vitamina D



**Clínicamente probado para
promover la salud digestiva.¹**



Trastornos gastrointestinales funcionales

- Reducción del tiempo de llanto en lactantes con cólicos.
- Motilidad intestinal mejorada y menos regurgitación.
- Reducción de la constipación en niños y adultos.
- Reducción del dolor abdominal funcional.



Gastroenteritis aguda

- Duración acortada de diarrea acuosa y vómitos.



Efectos gastrointestinales asociados a antibióticos

- Reduce la incidencia de efectos secundarios asociados a los antibióticos.



Protección contra infecciones

- Reduce la incidencia de diarrea e infecciones del tracto respiratorio.
- Refuerza la inmunidad.



Gotas Probióticas

Probado en **CÓLICOS, TRASTORNOS DIGESTIVOS FUNCIONALES** (reflujo, constipación y diarreas)

Dosis diaria: 5 gotas

Presentación: Frasco de 5 ml (20 dosis)

Desde el nacimiento



Gotas Probióticas con Vitamina D₃

INMUNIDAD- PROTECCIÓN: Probado en trastornos digestivos funcionales. Con Vitamina D que ayuda a fortalecer el sistema inmune.

Dosis diaria: 5 gotas

Presentación: Frasco de 5 ml (20 dosis)



Gotas Probióticas con Vitamina D₃

Probado en el alivio de los **SÍNTOMAS GRIPALES**.

Con Vitamina D que ayuda a fortalecer el sistema inmune.

Dosis diaria: 5 gotas 2 veces al día.

Presentación: Frasco de 5 ml (20 dosis)



Comprimidos Masticables Probióticos

Probado en **DIARREAS, DIARREAS POR ANTIBIÓTICOS** constipación y dolor abdominal crónico.

Presentación: 10 comprimidos masticables.

Dosis diaria: 1-2 comprimidos masticables.

Apto para niños a partir de los 4 años.



~ 100% ~
puré de Fruta
ORGÁNICO

**Sabor
Manzana**



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g)	%VD*
Valor energético	68 Kcal= 286 kJ	3
Carbohidratos, de los cuales:	15,8 g	5
Azúcares totales	11,3 g	-
Azúcares añadidos	0,0 g	-
Proteínas	0,4 g	1
Grasas totales	0,4 g	1
Grasas saturadas	0,0 g	0
Grasas trans	0,0 g	-
Fibra alimentaria	0,4 g	2
Sodio	4 mg	0

*Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas

INGREDIENTES

Pulpa de manzana orgánica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g)	%VD*
Valor energético	50 Kcal= 213 kJ	3
Carbohidratos, de los cuales:	12 g	4
Azúcares totales	12 g	-
Azúcares añadidos	0,0 g	-
Proteínas	0,5 g	1
Grasas totales	0,0 g	0
Grasas saturadas	0,0 g	0
Grasas trans	0,0 g	-
Fibra alimentaria	1,6 g	7
Sodio	14 mg	1

*Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas

INGREDIENTES

Pulpa de manzana orgánica, Pulpa de durazno.



**Sabor Manzana
y Durazno**



FRUTA QUE DISFRUTAN

PARA BEBÉS Y NIÑOS



**Sabor Manzana,
Pera y Banana**



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g)	%VD*
Valor energético	64 Kcal= 269KJ	3
Carbohidratos, de los cuales:	14,6 g	5
Azúcares totales	8,6 g	-
Azúcares añadidos	0,0 g	-
Proteínas	0,4 g	1
Grasas totales	0,4 g	1
Grasas saturadas	0,0 g	0
Grasas trans	0,0 g	-
Fibra alimentaria	0,4 g	2
Sodio	4 mg	0

*Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

INGREDIENTES

Pulpa de manzana orgánica, Pulpa de pera orgánica, Pulpa de banana.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	CANTIDAD POR PORCIÓN (90 g)	%VD*
Valor energético	74 Kcal= 311 kJ	3
Carbohidratos, de los cuales:	17,0 g	6
Azúcares totales	10,2 g	-
Azúcares añadidos	0,0 g	-
Proteínas	0,3 g	0
Grasas totales	0,5 g	1
Grasas saturadas	0,0 g	0
Grasas trans	0,0 g	-
Fibra alimentaria	0,4 g	2
Sodio	7 mg	0


*Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

INGREDIENTES

Pulpa de pera orgánica.



**Sabor
Pera**



INSTRUCCIONES DE USO

Agitar antes de abrir. Una vez abierto conservar en heladera por no más de 12 hs. Conservar cerrado en lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN

El proceso de pasteurización asegura su conservación sin frío. Consumir únicamente si el sellado y hermeticidad del envase se encuentra en perfectas condiciones. Ver lote y fecha de vencimiento en el envase. Consumir preferentemente antes del vencimiento indicado en el envase.

VIDA ÚTIL

18 meses.

PRECAUCIÓN

Mantenga la tapa fuera del alcance de los niños.

Recuerde siempre usar con la supervisión de un adulto.

IMPORTANTE

Este producto es un alimento complementario dado que los requerimientos nutricionales varían de un niño a otro.

CONSULTE A SU MÉDICO.

NutriBio Kids

PREPARACIÓN



80 ml
de agua

4 medidas
al ras de
NutriBio

100 ml de
NutriBio

4 medidas de 5,3 gr = Dilución al 21%

PRESENTACIÓN

Lata x 400 grs.
Sabor vainilla.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	Cada 200ml (al 21%)	Cada 100g de polvo	% IDR 1-3 años x200ml**	% IDR 4-6 años x200ml**	% IDR 7-9 años x200ml**	% VD x200ml***
Energía, kcal/kJ	200/838	477/1996				10
Carbohidratos totales, g de los cuales:	24	57				8
Azúcares totales, g	6,8	16				
Azúcares añadidos, g	0,9	2,2				
Lactosa, g	5,9	14				
Maltodextrina, g	18	43				
Proteínas, g	5,9	14	45	31	17	8
Grasas totales*, g	8,8	21				16
Saturadas, g	2,7	6,4				12
Moninsaturadas, g	4,0	9,6				
Poliinsaturadas, g	2,3	5,4				
Ácido Linoleico, g	1,8	4,3				
Ácido α-Linolénico, g	0,3	0,7				
DHA, mg	8,8	21				
ARA, mg	8,8	21				
Colesterol, mg	16	38				
Fibra Alimentaria, g	1,0	2,4				4
Sodio (Na), mg	80	190				3
Cloro (Cl), mg	200	476				
Potasio (K), mg	260	620				
Calcio (Ca), mg	200	476	40	33	29	20
Fósforo (P), mg	160	381	35	32	32	23
Magnesio (Mg), mg	34	81	57	47	34	13
Zinc (Zn), mg	2,0	4,8	49	39	36	29
Cobre (Cu), mcg	120	286	35	27	27	13
Hierro (Fe), mg	2,4	5,7	40	40	27	17
Iodo (I), mcg	17	40	23	15	17	13
Manganeso (Mn), mg	0,30	0,71	25	20	20	13
Molibdeno (Mo), mcg	5,9	14	35	27	27	13
Cromo (Cr), mcg	5,0	12	45	33	33	14
Selenio (Se), mcg	5,9	14	35	28	28	17
Vitamina A, mcg RE	121	289	30	27	24	20
Vitamina D, mcg	3,0	7,1	60	60	60	60
Vitamina E, mcg α-TE	4,0	9,5	80	80	57	40
Vitamina K, mcg	11	27	73	55	44	17
Vitamina C, mg	20	48	67	67	57	44
Vitamina B1, mg	0,40	0,95	80	67	44	33
Vitamina B2, mg	0,40	0,95	80	67	44	31
Niacina, mg	5,9	14	98	74	49	37
Vitamina B6, mg	0,40	0,95	80	67	40	31
Ácido Fólico, mcg	80	190	83	67	44	20
Vitamina B12	0,80	1,9	89	67	44	33
Ácido Pantoténico, mg	1,4	3,3	70	47	35	28
Biotina, mcg	8,0	19	100	67	40	27
Colina, mg	80	190	40	32	32	15
Taurina, mg	14	34				
L-carnitina, mg	3,4	8,1				
Inositol, mg	16	38				

*No contiene cantidades significativas de grasas trans. **Ingesta Diaria Recomendada según Res. Conj. 118/08 y 474/08-Tabla III Ingesta Diaria Recomendada de Proteína, Vitaminas y Minerales para Lactantes y Niños de 1 a 9 años. ***Valores Diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

100ml de **NutriBio Kids** = 4 medidas al ras de **NutriBio Kids** + 80ml de agua. 1 medida= 5,3g.
200ml de **NutriBio Kids** = 8 medidas al ras de **NutriBio Kids** + 160ml de agua. 1 medida= 5,3g.

INGREDIENTES

Maltodextrina, leche estandarizada, aceite de canola, caseinato de calcio, aceite de maíz, suero desmineralizado, aceite de coco, concentrado de proteína de suero, inulina, aceite de girasol alto oleico, fosfato dicálcico, bitartrato de colina, sulfato de magnesio, lecitina de soja, aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (ARA-DHA), aroma, ascorbato de sodio (Vitamina C), inositol, taurina, pirofosfato férrico, niacinamida (Vitamina B3), sulfato de zinc, palmitato de ascorbilo, acetato de DL-tocoferol (Vitamina E), L-carnitina, lactobacillus acidophilus (Probióticos), pantotenato de calcio (Vitamina B5), sulfato de manganeso, ácido fólico (Vitamina B9), concentrado de tocoferoles mixtos, D-biotina, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), mononitrato de tiamina (Vitamina B1), cianocobalamina (Vitamina B12), riboflavina (Vitamina B2), sulfato de cobre, retinil palmitato (Vitamina A), colecalciferol (Vitamina D3), cloruro de cromo, molibdato de sodio, fitomenadiona (Vitamina K1).

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.



Suplemento dietario en polvo, con carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, para niños de 2 a 10 años sabor vainilla. Libre de gluten.

CARBOHIDRATOS

Lactosa 25% / Maltodextrina 75%
Sin azúcar.

GRASAS

Aceites vegetales: Canola, Girasol
alto oleico, Coco y Maíz.
TCM 20%, ARA-DHA.

PROTEÍNAS

6 grs. / Porción 200 ml.

SINBIÓTICOS

Prebióticos: FOS, Inulina.

Probióticos: Lactobacilus Acidophilus.

MICRONUTRIENTES

Con todos los minerales y vitaminas necesarios. Bajo en sodio. Libre de gluten.

NutriBio

PREPARACIÓN



80 ml
de agua

4 medidas
al ras de
NutriBio

100 ml de
NutriBio

**Medida: 5,5 gr = Dilución al 22%
1 Kcal/ml**

PRESENTACIÓN

Lata x 400 grs.

Sabor vainilla y sin sabor



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes	Cada 200ml (al 22%)	Cada 100g de polvo	%VD adultos en 200ml**	%IDR embarazadas en 200ml***
Energía, kcal/kJ	200/838	455/1904	10	
Carbohidratos totales, g de los cuales:	24	55	8	
Azúcares totales, g	7,2	16		
Azúcares añadidos, g	0,9	2,0		
Lactosa, g	6,2	14		
Maltodextrina, g	18	41		
Proteínas, g	8,8	20	16	12
Grasas totales*, g	7,5	17	14	
Saturadas, g	2,3	5,2	10	
Moninsaturadas, g	3,0	6,9		
Polinsaturadas, g	2,3	5,2		
Ácido Linoleico, g	1,2	2,7		
Ácido α-Linolénico, g	0,26	0,60		
Colesterol, mg	12	27		
Fibra Alimentaria, g	1,6	3,6	6,4	
Sodio (Na), mg	80	182	3	
Cloro (Cl), mg	240	545		
Potasio (K), mg	300	682		
Calcio (Ca), mg	200	455	20	17
Fósforo (P), mg	160	364	23	13
Magnesio (Mg), mg	46	105	18	21
Zinc (Zn), mg	2,4	5,5	34	24
Cobre (Cu), mcg	180	409	20	18
Hierro (Fe), mg	2,4	5,5	17	9
Iodo (I), mcg	20	45	15	10
Manganeso (Mn), mg	0,60	1,4	26	30
Molibdeno (Mo), mcg	7,9	18	18	16
Cromo (Cr), mcg	4	9,1	11	13
Selenio (Se), mcg	10	23	29	33
Vitamina A, mcg RE	151	344	25	19
Vitamina D, mcg	2,0	4,5	40	40
Vitamina E, mg α-TE	4,0	9,0	40	53
Vitamina K, mcg	16	36	25	29
Vitamina C, mg	30	68	67	55
Vitamina B1, mg	0,30	0,68	25	21
Vitamina B2, mg	0,30	0,68	23	21
Niacina, mg	4,0	9,1	25	22
Vitamina B6, mg	0,40	0,91	31	21
Ácido Fólico, mcg	90	205	38	25
Vitamina B12, mcg	1,6	3,6	67	62
Ácido Pantoténico, mg	1,4	3,2	28	23
Biotina, mcg	7,9	18	26	26
Colina, mg	70	159	13	16
Taurina, mg	1,0	2,2		
L-carnitina, mg	3,6	8,2		

*No contiene cantidades significativas de grasas trans. **Valores Diarios en base a una dieta de 2000kcal u 8400kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. ***IDR según Res. Conj. 118/08 y 474/08 - Tabla II: Ingesta Diaria Recomendada de Proteína, Vitaminas y Minerales para Mujeres Embarazadas o en Período de Lactancia.

100ml de **NutriBio** = 4 medidas al ras de **NutriBio** + 80ml de agua. 1 medida = 5,5g.
200ml de **NutriBio** = 8 medidas al ras de **NutriBio** + 160ml de agua. 1 medida = 5,5g.

INGREDIENTES

Maltodextrina, leche estandarizada, caseinato de calcio, concentrado de proteína de suero, aceite de canola, inulina, aceite de coco, aceite de maíz, aceite de girasol alto oleico, suero desmineralizado, fosfato dicálcico, sulfato de magnesio, bitartrato de colina, lecitina de soja, ascorbato de sodio (Vitamina C), aroma, pirofosfato férrico, acetato de DL-α-Tocoferol (Vitamina E), sulfato de zinc, niacinamida (Vitamina B3), L-carnitina, palmitato de ascorbilo, lactobacillus acidophilus (Probióticos), cianocobalamina (Vitamina B12), pantotenato de calcio (Vitamina B5), ácido fólico (Vitamina B9), sulfato de manganeso, concentrado de tocoferoles mixtos, D-biotina, clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), sulfato de cobre, mononitrato de tiamina (Vitamina B1), retinil palmitato (Vitamina A), riboflavina (Vitamina B2), colecalficerol (Vitamina D3), molibdato de sodio, yoduro de potasio, cloruro de cromo, fitomenadiona (Vitamina K1).

CONTIENE LECHE Y DERIVADOS DE SOJA.



CON
SINBIÓTICOS
FOS + INULINA
+ PROBIÓTICO

Único suplemento nutricional completo y equilibrado con sinbióticos. Ideal para la recuperación nutricional de adultos y niños mayores de 10 años, con dietas insuficientes.

ÚNICO CON BENEFICIO SINBIÓTICO

PREBIÓTICOS (+) **PROBIÓTICOS**
(FOS + Inulina) (Lactobacillus Acidophilus)

- ✓ Fortalece el sistema inmune
- ✓ Mejora el tránsito intestinal
- ✓ Favorece una microbiota saludable
- ✓ Mejora la recuperación del paciente en convalecencia

Nutrex^{CC}

Caseinato de Calcio

**Alimento para propósitos médicos
específicos a base de proteínas
(caseinato de calcio)**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por porción (3,1 g de polvo)

NUTRIENTES	Cada 100g de polvo	Cada 100ml
Energía, Kcal	391	-
Carbohidratos totales, g de los cuales	0	0
Azúcares totales, g	0	0
Azúcares añadidos, g	0	0
Proteínas, g	95	9
Grasas Totales, g	1	0
Fibra Alimentaria, g	0	0
Sodio, mg	19	1,8
Potasio, mg	9	0,87
Calcio, mg	1466	136



INDICADO PARA: Personas con indicación de dieta hiperproteica: desnutrición, cirugías, enteropatía perdedora de proteínas, quemaduras, deportistas

ADMINISTRACIÓN: Vía oral y sonda nasogástrica. No apto para uso parenteral.

Nutrex^{EPS}

Espesasante

**Alimento para propósitos médicos a base
de almidón de maíz modificado instantáneo
para espesar alimentos y bebidas**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por porción (3,7 g de polvo)

NUTRIENTES	Cada 100g	Cada 100ml	%VD*
Energía, Kcal	372	40	2
Carbohidratos totales, g de los cuales	93	10	3
Azúcares totales, g	0	0	0
Azúcares añadidos, g	0	0	0
Proteínas, g	0	0	0
Grasas Totales, g	0	0	0
Fibra Alimentaria, g	0	0	0
Sodio, mg	210	23	1

*%Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.



INDICADO PARA: Pacientes con trastornos deglutorios, producida por enfermedades neurológicas, tumores de cabeza y cuello, parálisis cerebral.

ADMINISTRACIÓN: Vía oral.
No apto para uso parenteral.

Nutrex^{MDX}

Maltodextrina

Alimento para propósitos médicos específicos a base de carbohidratos (maltodextrina)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por porción (5,3 g de polvo)

NUTRIENTES	Cada 100 g	Cada 100 ml
Energía, Kcal	386	-
Carbohidratos totales, g de los cuales	96	5,1
Azúcares totales, g	4,8	0,26
Azúcares añadidos, g	4,8	0,26
Proteínas, g	0	0
Grasas Totales, g	0	0
Fibra Alimentaria, g	0	0
Sodio, mg	60	3,2



INDICADO PARA: Pacientes con requerimientos calóricos aumentados. (deportistas, pacientes con enfermedad intestinal infamatoria, resecciones intestinales, quemados, sépticos, desnutridos, fístulas entéricas, insuficiencia pancreática, pancreatitis crónica, fibrosis quística del páncreas, hemodiálisis).

ADMINISTRACIÓN: Vía oral y sonda nasogástrica. No apto para uso parenteral.

Nutrex^{TCM}

Triglicéridos de Cadena Media

Alimento para propósitos médicos específicos, líquido, a base de triglicéridos de cadena media para niños y adultos

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NUTRIENTES	Cantidad por 100ml
Valor energético, g	900 kcal / 3766 kJ
Carbohidratos totales, g de los cuales	0
Azúcares totales, g	0
Azúcares añadidos, g	0
Proteínas, g	0
Grasas totales, g	100
Grasas saturadas, g	100
Ácido caprílico, g	60
Ácido cáprico, g	40
Grasas trans, g	-
Fibra, g	0
Sodio, mg	0



INDICADO PARA: Tratamiento dietético de pacientes con trastornos de la digestión, absorción y transporte de lípidos.

ADMINISTRACIÓN: Vía oral y sonda nasogástrica. No apto para uso parenteral.



ETHICAL NUTRITION
DIVISIÓN NUTRICIONAL ROEMMERS

Encontra todos nuestros
productos en:



Bebéshop



www.sancorbebeshop.com.ar

  [@sancorbebeshop](https://www.instagram.com/sancorbebeshop)

